



LA PHARMACIE À L'ÉCOLE À L'USAGE DE TOUS LES PERSONNELS

OCTOBRE 2001

De la Sarthe

CONSIGNES

- Le matériel doit être
 - propre
 - rangé
- Remplacement des produits utilisés
- Destruction des produits périmés
- Prévoir des petits conditionnements

ÉQUIPEMENT POUR LES SOINS

- Poste d'eau à commande non manuelle
- Distributeur de savon liquide
- Distributeur de serviettes à usage unique
- Distributeur de gants jetables (obligatoire pour les soins)
- Poubelle équipée d'un sac plastique
- Réfrigérateur
- Plaque électrique ou bouilloire électrique
- Armoire à pharmacie fermant à clef, située en hauteur à proximité d'un point d'eau

CONTENU DE L'ARMOIRE À PHARMACIE

- Flacon de savon de Marseille
- Héxoméline solution à 1/00
- Compresses individuelles purifiées
- Pansements adhésifs hypoallergiques
- Pansements compressifs
- Sparadrap
- Bandes de gaze de 5cm, 7cm, 10cm
- Écharpe de 90cm de base
- Pince à échardes
- Paire de ciseaux
- Thermomètre frontal
- Couverture isothermique
- Coussin réfrigérant (à conserver dans le réfrigérateur) ou compresses watergel
- Lampe de poche

LES MÉDICAMENTS CONCERNANT LES ENFANTS AYANT UN PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (P.A.I.)

Les médicaments prévus, avec l'ordonnance du médecin, seront contenus dans une trousse au nom de l'élève en précisant sa classe, accessible à toutes les personnes impliquées dans le P.A.I.

RASSURER, ISOLER, NE PAS MINIMISER, NE PAS DRAMATISER

PLAIE SUPERFICIELLE

- Nettoyer à l'eau et au savon puis désinfecter avec une compresse imbibée d'un antiseptique incolore (Héxomédine solution au millième)
- Mettre un pansement

PLAIE PROFONDE

- Rassurer
- Position allongée ou assise si plaie au thorax
- Ne jamais donner à boire
- **Ne pas retirer un corps étranger**
- Alerter le SAMU (15)

SAIGNEMENT ABONDANT (SANS CORPS ÉTRANGER, NI FRACTURE OUVERTE)

- Position allongée ou assise si plaie au thorax
- Comprimer : c'est-à-dire appuyer très fort avec la main où cela saigne avec plusieurs épaisseurs de compresses maintenues par un pansement, ou mettre un pansement compressif prêt à l'emploi
- Ne pas relâcher la compression

RESTER VIGILANT : AU MOINDRE

SAIGNEMENT DE NEZ

- Faire moucher l'enfant
- Appuyer fortement sur les deux narines, élève assis, tête légèrement penchée en avant jusqu'à l'arrêt du saignement au moins pendant cinq minutes
- Alerter le SAMU (15) si le saignement se prolonge au-delà de dix minutes

BRÛLURE THERMIQUE OU CHIMIQUE

- Faire ruisseler de l'eau du robinet sur la blessure pendant 5 minutes et protéger, si besoin, par une compresse stérile (pas de pommade ni de corps gras)
- Alerter le SAMU (15) en cas de brûlure importante ou profonde

BRÛLURE ÉLECTRIQUE

- Couper le courant
- Allonger
- Surveiller ventilation et pouls
- Alerter le SAMU (15)

CONTUSION SIMPLE

- Poser un coussin réfrigérant ou un sac de glace entouré d'un linge sur le point douloureux
- Être prudent. Penser à une fracture : dans ce cas, ne pas mobiliser

SUSPICION DE FRACTURE

- Ne pas mobiliser
- Alerter le SAMU (15)

CHOC À LA TÊTE

- Surveiller : agitation, endormissement, vomissements sont les signes de gravité pouvant apparaître longtemps après – dans ce cas, alerter le SAMU (15)

MALAISE – ÉVANOUISSEMENT

- Allonger sur le côté
- S'assurer que la victime respire librement

EN DOUTE, ALERTE LE SAMU (15)

PIQÛRE D'INSECTE

- Désinfecter, puis refroidir
- Si les piqûres se situent à l'intérieur de la bouche ou si la victime est allergique : risque de réaction violente (gonflement, gêne respiratoire) - dans ce cas alerter le SAMU (15)

ATTEINTE DE L'ŒIL

- Toute blessure de l'œil est potentiellement grave et nécessite une consultation spécialisée
 - **en cas de projection liquide** : faire un lavage abondant à l'eau
 - **en cas de corps étranger** : ne pas chercher à l'enlever – alerter le SAMU (15)

CHUTE SUR LE DOS

- Vérifier l'état de conscience – si inconscient, alerter le SAMU (15)
- Si fourmillements ou paralysie au niveau des membres, ou douleur importante au niveau du dos – alerter le SAMU (15)
- Ne pas mobiliser

DANS TOUS LES CAS, PRÉVENIR LA FAMILLE

TROUSSE POUR DÉPLACEMENTS À L'USAGE DES ENSEIGNANTS

- Consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence (protocole d'alerte du SAMU et conseils techniques)
- Prévoir un téléphone mobile (SAMU : 112)
- Savon de Marseille liquide
- Antiseptique (Héxomédine au millième)
- Compresses
- Paire de ciseaux
- Pince à écharde
- Pansements
 - adhésifs hypoallergiques
 - compressifs
- Sparadrap hypoallergique
- Bande, écharpe
- Médicaments et ordonnance concernant les enfants ayant un Projet d'Accueil Individualisé
- Toujours avoir un bidon d'eau